

**Gebrauchsanleitung des Liebig-Dispensers wurde AKTUALISIERT!**


**Für alle Nutzer des Liebig-Dispensers zur Verdunstung von Ameisensäure 60% ad.us.vet.**  
 Der Liebig-Dispenser ist seit Jahren bei vielen Imkern im Einsatz. Änderungen der Gebrauchsanleitung bekommt man daher eventuell nicht mit, deshalb hier der

**DE**  
**Dochtpapier**

Grundeinstellungen der Dochtpapierfläche für die Behandlung mit Formivar 60 (Grün) und Formivar 85 (Rot)  
 Temperaturangaben entsprechen den zu erwartenden maximalen Temperaturen gemäss Wetterprognosen.

**EN**  
**paper-wick**

Sizing of paper-wick for a treatment with Formivar 60 (green) and Formivar 85 (red)  
 Temperature levels corresponds to the daily maximum temperatures according to weather forecast.

FORMIVAR® 60%	CH-Kasten Ruche Süsse (Bürki) Armia Svizzera	Nuclei Mini Plus Warré	Zander, DNM Langstroth Segeberger National Simplex, Smith 2xWarré	Dadant 2xSimplex AZ (Alberti- Znidarsic) Commercial Deep National	2xZander 2xDNM 2xSegeberger 2xLangstroth 4xWarré
	Vol. 40 l	Vol. -20 l	Vol. -40 l	Vol. -50 l	Vol. -80 l
25-30 °C	 1. 100 ml, 7 d 2. 150 ml, 10 d	 1. 100 ml, 7 d 2. 150 ml, 10 d	 1. 150 ml, 7 d 2. 150 ml, 10 d	 1. 200 ml, 7 d 2. 200 ml, 10 d	 1. 200 ml, 7 d 2. 200 ml, 10 d
20-25 °C	 1. 100 ml, 7 d 2. 150 ml, 10 d	 1. 100 ml, 7 d 2. 150 ml, 10 d	 1. 150 ml, 7 d 2. 150 ml, 10 d	 1. 200 ml, 7 d 2. 200 ml, 10 d	 1. 200 ml, 7 d 2. 200 ml, 10 d
15-20 °C	 1. 100 ml, 7 d 2. 150 ml, 10 d	 1. 100 ml, 7 d 2. 150 ml, 10 d	 1. 150 ml, 7 d 2. 150 ml, 10 d	 1. 200 ml, 7 d 2. 200 ml, 10 d	 1. 200 ml, 7 d 2. 200 ml, 10 d

d = Tag, day, jour, giorno  
 1. = Erste Behandlung, first treatment, première traitement, primo trattamento  
 2. = Zweite Behandlung, second treatment, deuxième traitement, secondo trattamento  
 Vol. = Beutevolumen, Hive Volume, Volume de la ruche, volume d'arnia

 Verwendung von Formivar 85% wird empfohlen.  
 Use of Formivar 85% is recommended.  
 Utilisation de Formivar 85% est recommandée.  
 L'uso del Formivar 85% è consigliato.

 Verwenden Sie 2 Dochtpapiere pro Behandlung.  
 Use 2 paper-wicks per treatment.  
 Utilisez 2 papiers par traitement.  
 Utilizzare 2 carte per trattamento.

2001 281V

**Hinweis:** In der [Gebrauchsanleitung](#) (Link) des Liebig-Dispensers von der Firma andermatt-biovet wird im Text auf der Seite 2 nur die Anpassung, d.h. Auflegen eines zweiten identischen Dochtpapieres, bei zu geringer Verdunstung beschrieben.

Bei der Abbildung hingegen (siehe links) werden bei Verwendung von 60%iger Ameisensäure grundsätzlich ZWEI (2) Dochtpapieren empfohlen, für ein- und zweiräumige DNM- und Zander-, als auch für Dadantbeuten.

Bitte beachten.

Ich bedanke mich bei F. Gehring, Bregtal für den Hinweis!

Und wünsche allen eine gute und wirksame Behandlung!

10  
x 210 mm

Mit freundlichen Grüßen  
**Bruno Binder-Köllhofer**  
 Fachberater für Imkerei  
 Regierungspräsidium Freiburg

Telefonische Erreichbarkeit: Regulaär am Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr, gerne auch an anderen Tagen, vorwiegend vormittags und selbstverständlich per Email.

**Abwesenheit (Urlaub):** Mo. 27. 7. – Mo. 3. 8. 2020 sowie Mo. 24.08. - Fr. 18.09 2020

**Bruno Binder-Köllhofer**  
 Regierungspräsidium Freiburg  
 Fachberater Imkerei

**bruno.binder-koellhofer@rpf.bwl.de**  
 +49 (761) 208-1285 Geschäftlich  
 0175 / 72 48 200 Mobiltelefon  
 79095 Freiburg (Postadresse)  
 Dienstgebäude: Talstr. 4-8